

FIPRODRAG® 2,68 mL - Perro 20-40 Kg

ANTIPARASITARIO EXTERNO.



Fiprodrag® está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), piojos (*Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros sobre 10 semanas de edad. Su uso además se recomienda como terapia complementaria de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en perros. En estos casos se recomienda la aplicación mensual, y además a los animales que cohabitan con ellos.

Eficacia: Con una sola aplicación, Fiprodrag® permite controlar la reinfestación por un período de al menos 8 semanas contra pulgas y de al menos 5 semanas contra garrapatas en perros. Si la carga parasitaria es alta se recomienda una aplicación mensual. Por sus propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste baños luego de 48 horas posteriores a su aplicación. No se recomienda bañar a la mascota 48 antes y después de aplicado el producto.

Ficha Técnica

ESPECIES

Perros de 20 a 40 kilos de peso.

FORMA FARMACÉUTICA

Solución tópica.

ACCIÓN TERAPÉUTICA

Antiparasitario externo.

COMPOSICIÓN

Cada mL de solución contiene:

Fipronil.....100 mg

Excipientes c.s.p.....1 mL

PROPIEDADES

Efectiva acción contra pulgas, piojos y garrapatas en perros.

INDICACIONES

Fiprodrag® está indicado para el tratamiento y control de la infestación por pulgas (*Ctenocephalides felis* y *Ctenocephalides canis*), piojos (*Trichodectes canis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros sobre 10 semanas de edad. Su uso además se recomienda como terapia complementaria de la dermatitis alérgica por pulgas (DAPP) en perros. En estos casos se recomienda la aplicación mensual, y además a los animales que cohabitan con ellos.

Eficacia: Con una sola aplicación, Fiprodrag® permite controlar la reinfestación por un período de al menos 8 semanas contra pulgas y de al menos 5 semanas contra garrapatas en perros. Si la carga parasitaria es alta se recomienda una aplicación mensual. Por sus propiedades lipofílicas, Fiprodrag® resiste baños luego de 48 horas posteriores a su aplicación. No se recomienda bañar a la mascota 48 antes y después de aplicado el producto.

MODO DE APLICACIÓN

1. Retirar la punta superior marcada de la pipeta.
2. Poner la punta de la pipeta directamente sobre la piel del animal, a la altura de las escápulas (hombros) o en la base del cuello, procurando separar el pelo.
3. Apretar y vaciar totalmente el contenido de la pipeta en 2 o 3 puntos como se indica en la figura del envase.

VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

Uso externo, mediante aplicación cutánea.

La dosis de Fipronil formulado como solución tópica para perros y gatos se ha establecido entre 6,7 a 13,4 mg/Kg de peso del animal a tratar. En perros de 20 a 40 Kg de peso, aplicar una pipeta de 2,68 mL.

CONTRAINDICACIONES

- No administrar a perros menores a 10 semanas de edad.
- No administrar en conejos.

PRECAUCIONES

- Administrar con precaución en animales debilitados.
- La raza Bichon Frisé es particularmente susceptible a las reacciones adversas del Fipronil.

PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

Precauciones para la persona que administra el producto:

- Evitar tocar el contenido de la pipeta con los dedos.
- Lavarse las manos con agua y jabón después de aplicar y manipular el producto.
- Durante la aplicación del producto no comer alimentos, fumar, ni beber líquidos.
- Evite manipular a su mascota inmediatamente después del tratamiento, hasta que el pelaje se encuentre completamente seco.
- Descartar las pipetas vacías de forma segura. No eliminar pipetas vacías en cursos de aguas naturales.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Solamente para uso externo.
- El producto puede ser dañino si es ingerido.
- Producto tóxico para peces, aves y abejas.
- Producto inflamable.

EFFECTOS SECUNDARIOS

- Si el animal se lamiese puede existir un breve período de hipersalivación.
- En el caso de existir hipersensibilidad o irritación local se recomienda no repetir en tratamiento.

OBSERVACIONES

- VENENO.

- Inflamable.

CONSERVACIÓN

- Conservar en el envase original a temperatura ambiente, entre 15º y 30ºC y en un lugar seco.
- Mantener alejado de las fuentes de calor.
- No almacenar con productos alimenticios.

CONDICIÓN DE VENTA

Venta libre.

PRESENTACIÓN

Display termocontraíble conteniendo 1 pipeta de 2,68 mL para perros de 20 a 40 Kg de peso.

ELABORADO POR

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

REGISTROS

Reg. SAG N° 2162

PAÍSES DONDE SE COMERCIALIZA

Importado y distribuido en Bolivia por:

ZOOFARMA

TEL: +(591)222-3357

Calle Díaz Romero 1339, entre avenida Saavedra y Avenida Busch, La Paz.

ARCHIVOS DESCARGABLES

[Fiprokill y Fiprodrag](#)

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico

Veterinario