

# SINPUL<sup>®</sup> SPRAY - Solución Tópica

---

## ANTIPARASITARIO EXTERNO



Elimina pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.

## Ficha Técnica

### ESPECIES

---

Perros.

### FORMA FARMACÉUTICA

---

Solución spray.

### ACCIÓN TERAPÉUTICA

---

Antiparasitario externo

### COMPOSICIÓN

---

Cada 100 mL contiene:

Permetrina.....0,2 g  
Piperonil Butóxido.....2,0 g  
Excipientes c.s.p.....100,0 mL

### INDICACIONES

---

Elimina pulgas (*Ctenocephalides felis*) y garrapatas (*Rhipicephalus sanguineus*) en perros.

## MODO DE APLICACIÓN

---

Rociar el producto en todo el cuerpo del perro, desde la cola al cuello (aplicación a contrapelo). Luego de aplicar, frotar vigorosamente con las manos todo el cuerpo para que el producto logre el máximo contacto con la piel y no solo quede en el pelaje.

Si el perro tiene una gran cantidad de pulgas y/o garrapatas, se recomienda repetir la aplicación cada 7 a 15 días.

## VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y DOSIS

---

Aplicación tópica.

### **Dosis de los principios activos:**

6 a 18 mg/Kg de Permetrina y 60 a 80 mg/Kg de Piperonil Butóxido.

### **Dosis del producto:**

Aplicar 4 a 11 atomizaciones por Kg de peso, dependiendo del largo del pelaje, en dosis única.

## CONTRAINDICACIONES

---

- No usar en gatos.
- No usar en cachorros menores a 6 semanas de edad.
- No administrar en animales con hipersensibilidad a los principios activos.
- No administrar en hembras preñadas o en lactancia.

## PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO

---

- Producto inflamable.
- Evitar el contacto con los ojos, boca u otras mucosas.
- En caso de irritación, suspender el uso del producto y lavar con abundante agua.

## PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR

---

- Al aplicar el producto usar guantes protectores.
- Lavarse las manos con abundante agua después de su uso.
- En caso de contacto con los ojos, boca o piel, lavar la zona afectada con abundante agua.

## ADVERTENCIAS

---

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Uso externo.

## EFFECTOS ADVERSOS

---

Se han descrito reacciones de hipersensibilidad cuando se administra Permetrina en forma tópica. En algunos casos podría ocurrir prurito o leve irritación en el sitio de aplicación.

## OBSERVACIONES

---

### **Precauciones especiales para la disposición del producto sin utilizar o el material de desecho:**

Desechar los restos de producto sin utilizar dentro de su envase original, bien cerrado. No arrojar el envase vacío o con restos de producto, en suelos, ríos, lagos o torrentes de agua, ya que es tóxico para animales acuáticos. No reutilizar el envase. Disponer los desechos de este producto con precaución junto con los desechos domésticos.

## CONSERVACIÓN

---

Mantener a temperatura ambiente (entre 15 y 30°C), en un lugar seco y lejos del fuego. Una vez abierto, utilizar el producto dentro de 12 semanas. Descartar el producto sin usar después de ese periodo de tiempo.

## CONDICIÓN DE VENTA

---

Venta libre

## PRESENTACIÓN

---

Frasco con atomizador con 200 mL y 500 mL

## ELABORADO POR

---

Laboratorio Drag Pharma Chile Invetec S.A.

## REGISTROS

---

Reg. SAG N° 0390

Usted ha ingresado a información de medicamentos o productos veterinarios destinados

exclusivamente a la(s) especie(s) indicada(s).

Laboratorio Drag Pharma no se responsabiliza por las consecuencias del mal uso de los productos, así como la utilización de esta información sin consultar a un Médico Veterinario